



Sacyl

Complejo Asistencial Universitario de Palencia

SERVICIO HEMATOLOGIA-HEMOTERAPIA  
SECCIÓN DIGESTIVO

## **PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO) CON DICUMARÍNICOS (**SINTROM** y **WARFARINA**).**

Si usted está tomando cualquiera de estos anticoagulantes y va a ser sometido a una ENDOSCOPIA le recomendamos que **EN CUANTO SEPA LA FECHA DE LA EXPLORACIÓN se ponga en contacto con el personal responsable del control del Tratamiento Anticoagulante Oral de su Centro de Salud** para comunicárselo con al menos 4-5 días de antelación.

También tienen a su disposición el teléfono **979 16 70 48** (9:00 - 14:00h) para ponerse en contacto directamente con Hematología del Río Carrión si tienen cualquier duda al respecto.

El día de la endoscopia **se realizará la determinación del INR justo antes de realizarse la endoscopia** (en la Unidad de Endoscopias).

1. En caso de **no realizarle ningún procedimiento (endoscopia diagnóstica)** ese mismo día o al día siguiente pasará por su C. Salud para solicitar que se reinicie el tratamiento anticoagulante oral (no es necesario que le realicen una determinación de INR capilar, únicamente comuníquese a la enfermera responsable). El día de la endoscopia deberá ponerse la heparina a la dosis indicada en la pauta de TAO previa (ponerla aproximadamente a las 21:00h).
2. En caso de **realizarse algún procedimiento (se le informará de ello)** demorará el inicio del anticoagulante a criterio del Servicio de Endoscopias (generalmente entre 3 y 5 días) mientras que seguirá administrándose la heparina a la dosis indicada en la pauta de TAO previa comenzando esa misma noche. Deberá acudir a su C. Salud para solicitar el inicio del TAO cerca de la fecha indicada por el Servicio de Digestivo (no es necesario que le realicen una determinación de INR capilar, únicamente comuníquese a la enfermera responsable).